

COPROCULTIVO GP1.2/INP/06

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado la prueba de coprocultivo, examen de deposición o de la zona anal para detección de organismos en las heces (materia fecal) que puedan causar enfermedad y síntomas gastrointestinales. Con estos análisis se podrán tomar decisiones terapéuticas según los resultados obtenidos.

REQUISITOS

- Obtenga la muestra antes de comenzar el tratamiento con antibióticos y sin ingerir laxantes. De no ser así informe al personal del laboratorio el tratamiento que está recibiendo.
- Solicitar en la toma de muestra un envoltorio con un tubo que contiene gel y una tórula con algodón en uno de sus extremos. No abrir el envoltorio hasta el momento de tomar la muestra.
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente. No refrigere.

TOMA DE MUESTRA

Para obtener una muestra optima se deben seguir los siguientes pasos:

- Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
- Abra el envoltorio y retire el tubo, saque la tórula e introduzca la punta con algodón en la deposición.
- Luego introduzca la tórula en el tubo de manera que el algodón quede en contacto con el gel.
- Este puede ser realizado por personal clínico en la toma de muestra introduciendo la torula en la zona anal directamente y en condiciones apropiadas.

Si el paciente utiliza pañal

- La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina o cremas, de lo contrario, tómela directamente en el tracto rectal.
- Introdúzcala cuidadosamente la torula en el tracto rectal unos 3 centímetros y gírela 3 ó 4 veces.
- Retírela y colóquela en el tubo, cuidando que el extremo con el algodón quede dentro del gel.

TRASLADO DE LA MUESTRA

Una vez tomada la muestra, lleve el tubo a la Unidad de Toma de Muestras antes de las 12:00 horas del día que realizo el examen.

TIEMPO DE RESPUESTA

El tiempo de respuesta de su resultado es de 72 horas.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras o llámenos al Laboratorio al fono 232730300.

